

# "5 situaciones" que pueden aumentar el riesgo de infección

## Situación ①

### Reuniones sociales con consumo de alcohol

- Beber alcohol eleva los ánimos y al mismo tiempo disminuye la atención. A su vez, embota la audición lo que provoca que se levante la voz al hablar.
- El riesgo de infección aumenta mucho cuando existe un gran número de personas en un espacio pequeño durante un largo período de tiempo.
- Además, el uso compartido de vasos y palillos aumenta el riesgo de infección.



## Situación ②

### Comidas durante mucho tiempo en grupos numerosos

- Comidas durante largo tiempo, recepciones y banquetes por la noche con consumo de alcohol aumentan el riesgo de infección en comparación con una comida rápida.
- Cuando un grupo numeroso de gente, de 5 o más personas, consume alimentos y bebidas, aumenta el riesgo de infección ya que es necesario levantar la voz y las gotas de saliva se esparcen con mayor frecuencia.



## Situación ③

### Conversación sin máscara

- Conversar de cerca sin una máscara aumenta el riesgo de infección por microgotas o por aire.
- Algunos casos de infección sin máscaras se observaron durante reuniones sociales en los karaokes estilo cabina.
- Cuidese al viajar dentro de un coche o autobús.



## Situación ④

### Convivencia en un espacio pequeño

- La convivencia en un espacio pequeño aumenta el riesgo de infección ya que varias personas utilizan un espacio cerrado durante un largo período de tiempo.
- Han llegado comunicaciones sobre casos sospechosos de infecciones en locales comunes como dormitorios y baños en las residencias o albergues.



## Situación ⑤

### Cambio de ubicación

- Si cambia de ubicación, por ejemplo, cuando hace una pausa en el trabajo, el riesgo de infección puede aumentar debido a la relajación y los cambios en el entorno ambiental.
- Han sido detectados casos sospechosos de infección en salas de descanso, zonas para los fumadores y guardarrobas.

